Условия для развития озимых культур перед уходом в зиму благоприятны на большей части территории Юга России, но на востоке этого макрорегиона к весне возможно повышение риска засухи, следует из анализа агрометеорологической ситуации, проведенного Национальным союзом агростраховщиков.

Исследование осуществлено с использованием инструментов космического мониторинга по состоянию на третью декаду октября.

«На Юге стартовала кампания страхования озимых – к 1 октября поступили сведения о страховании первых 302 тыс. га осеннего сева. Наиболее активно к этому моменту включились Волгоградская область, где застраховано 145 тыс. га, и Ставропольский край – 111 тыс. га. НСА ежегодно мониторит осенние условия для развития озимых и предпосылки к возникновению возможных рисков», – прокомментировал президент НСА Корней Биждов.

Результаты мониторинга и анализа метеопоказателей свидетельствуют о неоднородности состояния сельхозкультур и условий увлажнения почвы на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

«В целом посевы Юга России сейчас выглядят благополучно. На большей части территории и индекс вегетации растений NDVI, и показатели влаги в почве находятся на уровне среднемноголетних значений или выше их. Наблюдаемые поля в хорошем состоянии по зеленой массе в Крыму, Краснодарском крае, на уровне среднемноголетней нормы – в центре и на западе Ростовской области, в центральной части Ставрополья и более чем в половине районов Волгоградской области, в республиках Адыгея, Кабардино-Балкария и Северная Осетия-Алания. Но в восточной части макрорегиона заметено отставание индекса NDVI от среднемноголетних значений. В “красной зоне” – почти вся Калмыкия и прилегающие к ней восточные районы Ростовской области, север и северо-запад Ставрополья, юго-запад Волгоградской области. Наибольшие отрицательные отклонения зафиксированы в зоне восточной границы Ростовской области: до –25% и более от среднемноголетней нормы», – привел данные президент НСА.

Факторов, которые влияют на состояние озимых в октябре, несколько, уточняет Корней Биждов. Это может быть и более позднее проведение озимого сева, и влияние погодных

факторов. Засухи в регионе в целом нет. Но попавшие в «красную зону» территории, начиная со второй половины лета, характеризуются дефицитом показателя накопленных осадков. Наиболее сильно он выражен в отдельных районах Ростовской области и Ставропольском крае (примерно по 21%). Одновременно накопленные суммы температур в этих регионах превышают среднемноголетние значения на 3-6%.

Сочетание недостаточного количества осадков и повышенного температурного фона в октябре не способствует улучшению условий для оптимального развития сельхозкультур в данных зонах. «Итоговая ситуация будет определяться уровнем осадков и температурным режимом в зимний период. Если зима будет влажной, без суровых морозов, посевы смогут нормально завершить зимовку. НСА продолжит мониторинг ситуации», – подчеркнул Корней Биждов.

Википедия страхования, 03.11.2026 г.